

Upadacitinib bij inflammatoire darmziekten

Uw behandelend medisch specialist of verpleegkundig specialist heeft met u gesproken over de behandeling met Upadacitinib (Rinvoq). In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en hoe u moet handelen in geval van bijwerkingen. Het is echter géén vervanging van de bijsluiter. Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw behandelend medisch specialist of verpleegkundig specialist terecht.

Algemeen

Tot nu toe is de oorzaak van Colitis Ulcerosa en de ziekte van Crohn niet bekend. Dit medicijn wordt gebruikt bij inflammatoire darmziekten zoals de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziekte voor kunnen doen. De ziekte geneest niet door de behandeling met medicijnen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen kunnen de klachten weer terugkomen.

Werking

U gaat met Upadacitinib starten omdat andere medicijnen niet of onvoldoende voor u hebben geholpen. Upadacitinib behoort tot de groep van de Janus-Kinase remmers (JAK-remmers). JAK's zijn signaal-eiwitten binnenin de cel die betrokken zijn bij het ontstaan en onderhouden van ontstekingen. JAK-remmers zorgen ervoor dat ontstekingen in de darm minder actief zijn.

Effect van Upadacitinib

Het effect is ongeveer na 8 weken te verwachten.

Voorzorgsmaatregelen

Informeer uw behandelend medisch specialist of verpleegkundig specialist altijd indien er sprake is van één of meer van onderstaande omstandigheden:

- Een bekende allergie voor een van de stoffen van Upadacitinib
- Een ernstige infectie (zoals longontsteking of een bacteriële huidinfectie)
- Een actieve tuberculose (TBC)
- Ernstige leverproblemen
- Zwangerschap
- Herpes Zoster (gordelroos) of in het verleden gehad
- Hepatitis B of C of in het verleden doorgemaakt
- Recente vaccinatie
- Oncologische voorgeschiedenis
- Hoog risico op huidkanker
- Hartproblemen, hoge bloeddruk of hoog cholesterol
- Leverfunctiestoornissen
- Bloedstolsel in de aderen van uw benen of longen (in het verleden gehad)
- Nierproblematiek
- Diverticulitis (in het verleden gehad)

Voorbereiding start Upadacitinib

Omdat Upadacitinib het afweersysteem onderdrukt, kunnen bepaalde ziekten plotseling actief worden, bijvoorbeeld tuberculose (TBC) en hepatitis (besmettelijke leverontsteking). Je kunt tuberculose en hepatitis meedragen zonder dat je hiervan klachten hebt. Bij alle patiënten wordt voor de start van Upadacitinib gekeken of er een vroegere besmetting met tuberculose heeft plaats gevonden en een eventuele besmetting. Dit wordt getest via een bloedafname.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Vaccinaties

Vaccinaties zijn soms minder effectief als u Upadacitinib gebruikt. Ook als u ben ingeënt voordat u met Upadacitinib begint, bent u mogelijk minder goed beschermd. Houd hier rekening mee. Bij het gebruik van Upadacitinib is het advies om geen vaccinaties te nemen met een vaccin dat bestaat uit verzwakte levende virussen of bacteriën. Denk hierbij aan onder meer een gele koortsvaccinatie, een tuberculosevaccinatie (BCG), een vaccinatie tegen Rota virus, een vaccinatie tegen varicella (waterpokken) of een tyfusvaccinatie. Als één van deze vaccinaties toch nodig is, raadpleeg dan eerst uw medisch specialist of verpleegkundig specialist.

Pneumokokken vaccinatie

De pneumokok is een bacterie die vaak voorkomt in de bovenste luchtwegen zonder ziekte te veroorzaken. Omdat u een iets verminderde afweer heeft tegen infecties, heeft u een iets grotere kans dat u ziek wordt van deze bacterie. Wij adviseren daarom een pneumokokken vaccinatie.

Grieprik

U komt in aanmerking voor de (gratis) grieprik, omdat u een iets verminderde afweer tegen infecties heeft. Hiervoor kunt u bij uw huisarts terecht. De grieprik beschermt u niet tegen alle griepsoorten die er zijn.

Behandeling met Upadacitinib

Upadacitinib wordt toegediend in tabletvorm. Dit zijn tabletten van 15, 30 of 45 milligram.

Dosering Upadacitinib

U start met een inductietherapie van 8 weken. U krijgt dan één keer per dag 45 milligram. De inductiefase kan verlengd worden tot 16 weken.

Na deze periode begint de onderhoudstherapie die bestaat uit één keer per dag 15 of 30 milligram.

Bijwerkingen

Zoals bij alle geneesmiddelen, kan ook het gebruik van Upadacitinib bijwerkingen geven. Let wel, niet iedereen ondervindt deze bijwerkingen. In de bijsluiters die met de Upadacitinib geleverd wordt, staan alle beschreven bijwerkingen vermeld. Deze kunt u rustig nalezen.

Ernstige bijwerkingen

- Gordelroos of pijnlijke huiduitslag met blaren (herpes zoster) (vaak).
- Longinfectie (longontsteking), die kortademigheid, koorts en hoest met slijm veroorzaakt (soms).

Andere bijwerkingen:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- Keel- en neusinfecties
- Puistjes (acne)

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- Hoest
- Koorts
- Koortsuitslag
- Maag van streek (misselijkheid)
- Verstoorde laboratoriumwaardes (witte bloedcellen, verhoogd cholesterol, verhoogde leverenzymen, verstoorde nierfunctie)
- Gewichtstoename
- Ontsteking (zwellings) van de haarzakjes
- Griep
- Bloedarmoede
- Pijn in je buik
- Vermoeidheid
- Hoofdpijn
- Netelroos
- Urineweginfecties
- Huiduitslag

Contact opnemen

Krijgt u klachten van benauwdheid, pijn op uw borst of rug bij het ademen? Zweet u overmatig, hoest u bloed op of heeft u een

blauwachtige huid? Roep dan onmiddellijk medische hulp in. Deze verschijnselen passen bij een longembolie (bloedstolsel in de longen).

Combinatie met andere geneesmiddelen

De behandeling met Upadacitinib wordt vooralsnog niet gecombineerd met andere afweer onderdrukkende medicijnen zoals thiopurines, methotrexaat, ciclosporine en tacrolimus of anti-TNF middelen (Infliximab, Adalimumab en Golimumab) vanwege een toegenomen kans op infecties. Het advies is om geen grapefruits, grapefruitsap en producten waar grapefruit in voorkomen, te gebruiken.

Extra aandachtspunten

Vertel uw behandelend medisch specialist als u een operatie of tandheelkundige ingreep moet ondergaan.

Vertel de chirurg of tandarts, die de ingreep uitvoert, dat u een behandeling met Upadacitinib ondergaat.

Zwangerschap

Heeft u een kinderwens, overleg dan altijd eerst met uw behandelend medisch specialist of verpleegkundig specialist over deze wens en wat het gebruik van Upadacitinib hierin betekent. Er is weinig data bekend over zwangerschap bij Upadacitinib. Het advies is om niet zwanger te worden tijdens het gebruik van Upadacitinib.

Borstvoeding

Als je borstvoeding geeft of van plan bent dit te doen, overleg dan altijd eerst met uw behandelend medisch specialist of verpleegkundig specialist.

Er is weinig data bekend of Upadacitinib in de borstvoeding terecht komt. Het advies is om geen borstvoeding te geven tijdens het gebruik van Upadacitinib.

Autorijden

Upadacitinib heeft geen invloed of beperkte invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. U mag gewoon autorijden of apparaten bedienen gedurende de behandeling.

Tot slot

Heeft u lichamelijke klachten, neem dan contact op met uw verpleegkundig specialist via telefoonnummer: 088 708 7070. Zijn uw problemen of vragen niet dringend, overleg deze dan tijdens uw volgende bezoek aan de polikliniek.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze folder vragen, neem dan contact op met MDL-Centrum via telefoonnummer: 088 708 7070.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.