

JJ katheter inbrengen, verwisselen of verwijderen op het behandelcentrum.

U gaat binnenkort voor het inbrengen, verwisselen of verwijderen van een JJ katheter. Deze behandeling gebeurt op het behandelcentrum van de urologie. In deze folder vertellen wij u meer over de gang van zaken.

Vorbereiding

U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden. Wel is het belangrijk voor het onderzoek aan de uroloog te melden of u zwanger bent of medicijnen gebruikt.

Het onderzoek kan overigens wel plaatsvinden tijdens de menstruatie.

De uroloog doet het onderzoek poliklinisch met ondersteuning van verpleegkundigen. Een medewerker van de radiologie neemt tijdens het plaatsen of verwisselen röntgenfoto's.

Het kan zijn dat wij u opnemen voor dit onderzoek. Is dit niet het geval dan kunt u in een kleedkamer uw onderkleding uittrekken. Vóór het onderzoek moet u goed uitplassen.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel met de benen gespreid in beensteunen. Vervolgens reinigen wij de penis of schede met water. Bij het plaatsen of verwisselen van de JJ katheter dekken wij u gedeeltelijk met een disposable doek. Het is belangrijk dat u zich zo goed mogelijk ontspant en de aanwijzingen van de uroloog opvolgt. Dat vermindert de pijn en het ongemak tijdens het inbrengen van de kijkbuis (cystoscoop). De JJ katheter wordt via de kijkbuis geplaatst, verwisseld of verwijderd.

De uroloog brengt de kijkbuis via de opening van de plasbuis in de blaas. Via een slangetje aan de kijkbuis, verbonden met een zak vloeistof, brengen wij steriel water in de blaas. Hierdoor ontplooit de blaas zich en kunt u aandrang tot plassen krijgen.

Aandrang krijgt u pas als de blaas vol is, de blaas raakt nooit overvol.

Duur van het onderzoek

Het plaatsen of verwisselen van de JJ katheter duurt ongeveer 45 minuten. Het verwijderen van de JJ katheter duurt ongeveer 15 minuten.

Na afloop van het onderzoek

Na het plaatsen of verwisselen van de JJ katheter krijgt u een paar uur bedrust. Na het verwijderen van de JJ katheter kunt u vrijwel meteen naar huis. Gebruik van fiets, eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem.

Medicatie

U krijgt van ons bij plaatsen of verwisselen van de JJ katheter twee uur voor het onderzoek een tabletje antibiotica.

Complicaties

- Allergische reactie op de contrastvloeistof bij het plaatsen of verwisselen;
- Urineweginfectie;
- Niet kunnen plassen;
- Bloeding.

Patiëntveiligheid

ZGT ziet patiëntveiligheid als een vanzelfsprekende basis voor goede zorg en dienstverlening. Verschillende zorgverleners vragen daarom uw naam, geboortedatum en voor welke operatie of ingreep u komt. Dit gebeurt meerdere keren achter elkaar. Deze controle is voor uw veiligheid.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Nazorg thuis

Neem contact op met de polikliniek urologie bij:

- Koorts boven 38,5°C;
- Pijn of branderig gevoel bij het plassen;
- Bloed bij het plassen;
- Onvermogen om te kunnen plassen;
- Allergische reactie op de contrastvloeistof.

Polikliniek urologie

Binnen kantooruren

Telefoonnummer 088 708 33 90

Spoedeisende hulp

Buiten kantooruren

Telefoonnummer 088 708 78 78.

Vragen?

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, belt u dan gerust tijdens kantooruren met de polikliniek urologie. Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend specialist. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Uw behandelend specialist maakt dit aan u kenbaar.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.