

Emboliseren van de vena ovarica

Uw medisch specialist heeft u verwezen voor het emboliseren van de vena ovarica. Voor deze behandeling wordt u opgenomen op een verpleegafdeling in het ziekenhuis en kunt u meestal dezelfde dag naar huis. De behandeling vindt plaats op de OK. Op de dag van opname meldt u zich bij de gastenservice, receptie hoofdingang locatie Almelo. Datum en tijdstip wordt u per post toegestuurd.

Een niet goed werkende vena ovarica (afvoerende ader van de eileiders) kunnen het Pelvic Congestion Syndroom veroorzaken. Mensen met dit syndroom kunnen last hebben van bekkenspataders. Ook kan een niet goed werkende vena ovarica spataders veroorzaken in de lies-, bilstreek of bij de schaamlippen.

Bij emboliseren van deze niet goed werkende ader wordt gebruik gemaakt van coils (kleine metalen veertjes). Door deze coils wordt de ader afgesloten waardoor de spataders meestal zullen verdwijnen. Het lichaam zal een andere afvoerende ader gaan gebruiken.

Belangrijk om te weten

Zwangerschap

Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent, of denkt te zijn, moet u dit voor de behandeling melden.

Overgevoeligheden

Heeft u last van astma, hooikoorts of bronchitis, of bent u overgevoelig voor medicijnen, jodiumhoudende contrastvloeistof of andere stoffen, wilt u dit dan melden voor de behandeling. Uw specialist heeft daar al met u over gesproken.

Vorbereiding bij verminderde nierfunctie/ andere risicofactoren

Bij patiënten met een verminderde nierfunctie kan toediening van jodiumhoudende contrastmiddelen via de bloedbaan leiden tot

een acute vermindering van nierfunctie, ook wel contrastnefropathie genoemd.

Tijdens het polikliniekbezoek wordt uitleg gegeven over de eventuele te nemen voorzorgsmaatregelen. Hieronder valt het afspreken van een spoelschema met infuusvloeistof voor en na de behandeling, eventueel tijdelijk stoppen van specifieke medicijnen en controle van de nierfunctie 3 tot 7 dagen na de behandeling.

Dieet

Tot een ½ uur voor het melden bij de gastenservice mag u nog een licht ontbijt gebruiken:

- 1 snee brood of 2 beschuiten met beleg.
- 1 kop thee, koffie.

Daarna mag u niet meer eten, drinken of roken.

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Dan graag aandacht voor onderstaande. Heeft de arts u andere voorschriften gegeven, dan is het van belang dat u zich aan deze voorschriften houdt.

- Als u **Plavix** (clopidogrel) gebruikt kan u deze blijven doorslikken.
- Als u **Brilique** (ticagrelor) gebruikt kan u deze blijven doorslikken.
- Als u **Ascal of Aspirine** (acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium) gebruikt kan u deze blijven doorslikken.
- Als u **Plavix** (clopidogrel) in combinatie met **Ascal of Aspirine** (acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium)

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTInfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTInfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- gebruikt dient u **5 dagen** voor de behandeling te stoppen met **Plavix**.
- Als u **Brilique** (ticagrelor) in combinatie met **Ascal of Aspirine** (acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium) gebruikt dient u **5 dagen** voor de behandeling te stoppen met **Brilique** (ticagrelor)
 - Als u **Sintrom** (acenocoumarol) gebruikt, dient u hier **3 dagen** voor de behandeling mee te stoppen.
 - Als u **Marcoumar** (fenprocoumon) gebruikt, dient u hier **7 dagen** voor de behandeling mee te stoppen.
 - Als u **Pradaxa** (dabigatran) gebruikt, dient u hier 24 uur voor de behandeling mee te stoppen. Dit in overleg met uw aanvragend specialist.
 - Als u **Xarelto** (rivaroxaban) gebruikt dient u hier 24 uur voor de behandeling mee te stoppen. Dit in overleg met uw aanvragend specialist.
 - Als u **Eliquis** (apixaban) gebruikt dient u hier 24 uur voor de behandeling mee te stoppen. Dit in overleg met uw aanvragend specialist.
 - Als u **Lixiana** (edoxaban) gebruikt dient u hier 24 uur voor de behandeling mee te stoppen. Dit in overleg met uw aanvragend specialist.

Alle andere voorgeschreven medicijnen moet u blijven innemen indien anders voorgeschreven.

Bij gebruik van **Sintrom of Marcoumar** wordt bij uw opname bloed afgenomen.

Heeft u vragen over de medicijnen die u gebruikt dan kunt u altijd contact opnemen met uw aanvragend specialist.

Kleding

Aangezien de behandeling plaatsvindt op de OK, is het niet toegestaan om tijdens de behandeling een eigen pyjama te dragen. Van de verpleegkundige krijgt u bij uw opname een operatiejasje aan.

Tijdens en de eerste uren na de behandeling heeft u geen ondergoed aan. Mocht u snel last van koude voeten hebben, kunt u sokken meebrengen.

Aangezien uw zuurstofgehalte in het bloed tijdens de behandeling wordt gecontroleerd, vragen wij u nagellak/ kunstnagels van 1 hand te verwijderen.

Sieraden kunt u het beste thuis laten.

Verloop van de behandeling

U wordt behandeld door een interventieradioloog geassisteerd door interventielaboranten. Het streven is u anderhalf uur na opname te behandelen, echter kan het tijdstip uitlopen in verband met spoed patiënten.

U wordt in een bed naar de OK gebracht. Gedurende het verblijf op de OK wordt u meerdere keren vragen gesteld, dit in verband met de veiligheidscontrole.

U kunt op onze website meer lezen over deze veiligheidscontrole (Patiëntenfolders van ZGT/ Time-Out Procedure).

In de ontvangstruimte van de OK wordt in uw arm een infuusnaaldje ingebracht. Daarna neemt een interventielaborant u mee naar de interventiekamer. Tijdens de behandeling bewaakt de interventielaborant uw bloeddruk en het zuurstofgehalte in het bloed.

De aanprikplaats wordt ontsmet en verdoofd, dit kan even gevoelig zijn.

Tijdens de behandeling wordt u toegedekt met steriele lakens.

De interventieradioloog maakt een kleine opening in de huid en prikt de liesader aan. Vervolgens brengt hij een werkbuisje in. Door dit werkbuisje worden de katheters en materialen ingebracht die hij nodig heeft. Om aders zichtbaar te maken wordt gebruik gemaakt van röntgendoorlichting en een contrastmiddel.

Na het inspuiten van het contrastmiddel kunt u een warm gevoel krijgen of het gevoel hebben dat u plast, dit gevoel verdwijnt meestal binnen een minuut.

Aan de hand van de gemaakte foto's bepaalt de interventieradioloog de verdere behandeling.

Duur behandeling

De duur van de behandeling is moeilijk te voorspellen maar doorgaans duurt het 60 tot 90 minuten.

Na afloop van de behandeling

De interventieradioloog verwijdert het werkbuisje en drukt het gaatje met de hand dicht.

Op de afdeling

Na de behandeling gaat u naar de uitslaapkamer. Daarna gaat u naar de verpleegafdeling.

Op de verpleegafdeling moet u 1 uur blijven liggen. Meestal kunt u enkele uren na de behandeling naar huis. Het tijdstip hoort u van de zaalarts.

Indien u antistollingsmedicatie gebruikt zal de zaalarts beslissen wanneer u mag herstarten met uw antistollingsmedicatie.

Complicaties

Geen enkele invasieve behandeling (behandeling waarbij de huid of slijmvliezen worden gepasseerd) is zonder risico's. Zo kunnen ook tijdens of na een embolisatie complicaties optreden.

- Er kan een allergische reactie op het contrastmiddel ontstaan, wanneer u overgevoelig blijkt te zijn voor jodium.
- Het kan gebeuren dat het gaatje in het bloedvat weer opengaat en een bloeding in de lies optreedt.
- Daarnaast kan na de behandeling een blauwe plek ontstaan in de lies. Dit is vervelend, maar het trekt na verloop van tijd vanzelf weg.

Controleafspraak

U krijgt een afspraak voor controle (na 2 weken) op de polikliniek thuisgestuurd.

Vervoer

Wij adviseren u vervoer naar huis te regelen. U mag de dag van ontslag niet fietsen of autorijden.

Instructies voor thuis

De volgende regels worden aanbevolen na uw ontslag

- U kunt zich thuis douchen.
- De wond mag echter niet 'verweken'. Daarom mag u de eerste 4 dagen na de behandeling geen bad nemen en niet gaan zwemmen.
- Verwijder de pleister de volgende dag. Maak de huid schoon met milde zeep en water. Tevens de wond voorzichtig afdrogen.
- Aangepaste activiteiten gedurende 3-4 dagen: niet persen, niet bukken, zo min mogelijk de trap op- en afdgaan. Niet zwaarder tillen dan 5 kilo.

Neem contact op indien

- U koorts krijgt (38,5°C of hoger).
- De lies erg gevoelig/pijnlijk is.
- Een zwelling in de lies optreedt.
- De lies rood verkleurt en erg warm aanvoelt.
- U huiduitslag heeft.

Tijdens kantooruren kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat gynaecologie: 088 708 33 60.

Buiten kantoor tijden kunt u bij deze klachten en/of andere klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, bellen met de spoedeisende hulp van ZGT: 088 708 78 78.

Medische apparatuur (zoals een insulinepomp)

Gebruikt u een medisch apparaat zoals een insulinepomp of (externe) neurostimulator? Er bestaat een kleine kans dat de werking van het apparaat verstoord raakt door blootstelling aan röntgenstraling. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat om te zien hoe u hiermee om moet gaan.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet.

Kijk voor meer info op: www.zgt.nl/mijnzgt.