

Trombolyse

Lysis

Er is in overleg met u besloten dat u een trombolysebehandeling moet ondergaan. Deze behandeling is gekozen omdat er bij u sprake is van een afsluiting van een (slag-)ader of bypass als gevolg van een bloedstolsel. Bij trombolyse krijgt u een medicijn dat bloedstolsels kan oplossen. In deze folder leest u over de oorzaak van uw klachten, de behandeling, de nazorg en het ontslag.

De aandoening

Als gevolg van de afsluiting in uw bloedvaten stroomt er minder bloed naar de weefsels die van dat bloedvat afhankelijk zijn. Hierdoor krijgen deze weefsels minder bloed en dus minder zuurstof. Dit zorgt voor pijn. Bij een acute afsluiting kan het ook zorgen voor gevoelloosheid, witte verkleuring of het niet goed kunnen bewegen van vingers of tenen.

Vorbereiding op de behandeling

Voor deze behandeling, moet u enkele uren nuchter zijn. Afhankelijk van de tijd, mag u nog een licht ontbijt nemen. De specifieke afspraken worden vooraf met u besproken. Er wordt een infuusnaaldje ingebracht waarop een infuus kan worden aangesloten.

Gebruikt u medicatie dan kan het zijn dat u deze voorafgaand aan de operatie moet stoppen. Dit verschilt per persoon, per behandeling. Bepreek met uw medisch specialist wat voor uw situatie van toepassing is.

De behandeling

De behandeling wordt uitgevoerd door een radioloog en gebeurt via de lies. Uw huid wordt plaatselijk verdoofd waarna uw liesslagader wordt aangeprikt en een werkbuisje wordt ingebracht. Door dit werkbuisje worden katheters en materialen ingebracht die nodig zijn voor de behandeling. Er wordt contrastmiddel ingespoten om foto's te kunnen maken van uw bloedvaten. Dit noemt men een angiografie.

Op deze manier kan de afsluiting in uw slagader goed in beeld worden gebracht. De radioloog zal een katheter achterlaten in de slagader waar de afsluiting zich bevindt. Via deze katheter worden continu twee medicijnen toegediend. Het ene medicijn moet het stolsel oplossen, het andere houdt het bloed dun.

Deze medicijnen vergroten het risico op bloedingen. Hierom wordt u opgenomen op de intensive care. Hier wordt met behulp van een monitor uw bloeddruk, hartslag en hartritme regelmatig gecontroleerd. De katheter blijft tijdens uw verblijf op de intensive care in de slagader zitten.

- U heeft bedrust tijdens de hele behandeling. Uw hoofdsteen mag iets omhoog.
- U mag het been waarin de katheter zit niet bewegen. Hiermee voorkomt u dat de katheter gaat knikken.

Tijdens de behandeling en uw verblijf op de intensive care zal de radioloog controleren of de afsluiting reageert op de toegediende medicijnen. Dit wordt gecontroleerd door middel van het maken van een controle angiografie. Het is vooraf niet duidelijk hoe vaak een controle nodig is. Iedere afsluiting is anders en iedereen reageert anders op de medicatie. De radioloog bepaalt of de behandeling gestopt kan worden en brengt de chirurg hiervan op de hoogte. De chirurg bespreekt met u het verloop van de behandeling.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTInfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Na de behandeling

Wanneer de katheter verwijderd is, mag u over naar de gewone verpleegafdeling waar u nog een tot enkele dagen zal verblijven. Hoeveel dagen is afhankelijk van uw situatie.

U krijgt de volgende instructies om een nabloeding te voorkomen. De instructies die voor u gelden, liggen aan de techniek die wordt gebruikt om het gaatje in de lies dicht te maken.

Sluiten door middel van afdrukken met de hand

- U krijgt een drukverband, deze moet blijven zitten tot de volgende ochtend.
- De eerste 6 uur na de behandeling moet u plat in bed blijven liggen.
- Na 6 uur moet u nog steeds in bed blijven, maar mag u zitten. Onder begeleiding van een verpleegkundige is toiletbezoek toegestaan.
- U moet het been waarin u bent aangeprikt ontspannen laten liggen. Tot de volgende ochtend mag u uw been niet optrekken.
- Als u een warm gevoel krijgt in de lies of u ziet dat het nabloedt waarschuw dan direct de verpleegkundige.

Sluiten door middel van een plugje

- U krijgt 2 uur bedrust, u mag in een hoek van 30 graden zitten.
- U moet het been waarin u bent aangeprikt ontspannen laten liggen.
- Na deze bedrust kunt u voorzichtig starten met mobiliseren.
- Als u een warm gevoel krijgt in de lies of u ziet dat de punctieplaats nabloedt waarschuw dan direct de verpleegkundige.
- Afhankelijk van het soort plugje krijgt u een registratiekaartje mee. Op dit kaartje staat de aanprikkdatum en aanprikkplaats. Dit kaartje moet u, afhankelijk van het soort plugje dat gebruikt is, 30 of 90 dagen bij u dragen.

Risico's/complicaties

Bij iedere behandeling kunnen complicaties/bijwerkingen optreden. Om de kans daarop te verkleinen, worden er wanneer nodig voorzorgsmaatregelen genomen. Specifieke complicaties/bijwerkingen bij deze behandeling zijn:

- Er kan een allergische reactie ontstaan op het contrastmiddel, wanneer u overgevoelig blijkt te zijn voor jodium. Indien u bekend met overgevoeligheid voor jodium, is het van belang dat u dit doorgeeft aan uw behandelend medisch specialist.
- Er kan een bloeding in een ander deel van het lichaam of bij de wond in de lies ontstaan.
- U kunt last krijgen van misselijkheid, braken en hoofdpijn.

Nazorg thuis

Om de kans op complicaties te verminderen adviseren wij u om:

- Wanneer er een stent is geplaatst en/of de wond is gesloten met een plugje mag u 48 uur na de operatie weer douchen.
- Wanneer u geen stent heeft gekregen, mag u na 24 uur weer douchen.
- De eerste 3 tot 4 dagen mag u niet persen, niet bukken, zo min mogelijk de trap op- en afdalen. Niet zwaarder tillen dan 5 kilo.
- Gedurende 3-4 dagen wordt het besturen van een auto afgeraden.

Ontslag

Wanneer u met ontslag mag, wordt een controleafspraak voor u ingepland. Deze krijgt u met de post thuisgestuurd.

Bij problemen of bij één van onderstaande klachten neemt u contact op met het secretariaat vaatchirurgie tijdens kantooruren telefoonnummer 088 708 52 43.

Buiten kantooruren kunt u bellen met de afdeling spoedeisende hulp, telefoonnummer 088 708 78 78.

Neem contact op indien:

- U koorts krijgt (38,5°C of hoger).
- De lies erg pijnlijk is.
- Er een zwelling in de lies optreedt.
- De lies rood verkleurt en erg warm wordt.
- Uw been gevoelloos of pijnlijk aanvoelt.

Vragen

Deze brochure is een aanvulling op het gesprek met de hulpverlener en is niet bedoeld als vervanging van het gesprek. In deze folder kunt u alle informatie nog eens rustig nalezen. Indien u nog vragen heeft, kunt u deze altijd aan uw behandelend medisch specialist stellen. Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt