

Het verloop van de Bevacizumab/Capecitabine kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit twee medicijnen.

1. **B**evacizumab
2. **C**apecitabine

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca						
Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca						

Manier van toediening:

Bevacizumab wordt u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Dit gebeurt op de dagbehandeling oncologie van de ZGT.

De totale behandeling duurt ongeveer drie kwartier, waarbij de eerste en de tweede kuur door het opstarten van de bevacizumab langer zal duren.

Capecitabine kunt u zelf innemen, want dit zijn tabletten. U start hiermee op de avond van dag één en gaat hiermee door t/m de ochtend van dag 15. De volgende kuur start in principe drie weken na dag één als de bloedsuitslagen goed zijn.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38.5° C moet u contact met ons opnemen.
- U kunt last krijgen van diarree. Neem contact op met de oncologieverpleegkundige indien u vaker dan vier keer per dag diarree heeft. Zij zullen u adviseren over een passende behandeling. Blijf alert op uw ontlastingspatroon, de behandeling van diarree kan obstipatie (verstopping) als gevolg hebben.
- U kunt last krijgen van pijn op de borst, geef dit altijd door aan de behandelend specialist, verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige.
- Pijnlijke gezwollen handen en/of voeten, hiervoor kunt u viermaal daags bodylotion/handcrème of 10% ureumzalf gebruiken. Probeer knellende kleding en schoenen zoveel mogelijk te vermijden.
- Stomatitis: als de mond en/of keel pijnlijk, rood of gezwollen is of als u kapotte plekjes en zweren in de mond heeft. Goede mondverzorging en viermaal per dag spoelen met een zoutoplossing of kamille-/groene thee kan deze klachten al zoveel mogelijk voorkomen.
- Door de bevacizumab kan uw bloeddruk stijgen. Voor de toediening van bevacizumab wordt daarom uw bloeddruk gemeten.

- Tijdens en het gebruik van en tot 48uur na de laatste capecitabine wordt een zeer kleine hoeveelheid van het geneesmiddel uitgescheiden via lichaamsvloeistoffen, voornamelijk via uw urine. U hoeft zelf als patiënt geen beschermende maatregelen te nemen, maar voor familie en verzorgenden worden wel hygiënische voorzorgsmaatregelen noodzakelijk geacht als zij in direct contact kunnen komen met bijvoorbeeld urine, ontlasting of braaksel. Bij contact met urine, ontlasting of braaksel adviseren wij verzorgenden/naasten wegwerphandschoenen te dragen.

Manier van innemen:

- Neem de capecitabine in met een tussentijd van twaalf uur.
- Neem de capecitabine in binnen dertig minuten na iets gegeten te hebben.
- Slik de capecitabine zonder te kauwen in zijn geheel door met water
- Als u om medische redenen de tabletten niet heel kunt doorslikken dan kunnen de tabletten bij uitzondering en in overleg met en na instructie door uw behandelend specialist en apotheker worden vergruisd en/of worden opgelost.
- Als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven, neem dan eerst contact op met uw behandelend specialist.
- Neem vergeten dosering niet alsnog in en verdubbel een volgende dosering niet. Volg het normale behandelingschema en stop op de oorspronkelijke stopdatum.

De bijwerkingen van de bevacizumab staan beschreven in de bijgeleverde folder.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.