

Tijdelijk stoppen met het gebruik van fenprocoumon voor de operatie (overbruggingsbehandeling)

Binnenkort wordt u geopereerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat u vijf dagen voor de operatie stopt met het innemen van de fenprocoumon. In deze folder geven wij u hier meer informatie over.

De anesthesioloog of arts preoperatieve screening heeft het tijdelijk stoppen met het gebruik van fenprocoumon met u besproken. De operatiedatum en de datum waarop u stopt met de fenprocoumon vindt u in de opname brief.

LET OP:

Dit is een standaardschema. Het kan zijn dat uw trombosedienst een ander advies geeft. Volg in dat geval het advies van uw trombosedienst.

Voor de operatie

Voor de periode zonder fenprocoumon heeft u een recept voor injecties Fragmin (dalteparine) gekregen. Deze injecties nemen de werking van de fenprocoumon tijdelijk over. De injecties spuit u op de dagen zoals aangegeven in het schema. Indien de trombosedienst u anders adviseert, dan volgt u dat advies. Mocht de operatiedag wijzigen dan kunt u de data in het schema aanpassen.

		5 dagen voor de operatie	4 dagen voor de operatie	3 dagen voor de operatie	2 dagen voor de operatie	1 dag voor de operatie	de operatie dag
Datum							
Fenprocoumon		stop	stop	stop	stop	stop	stop
INR controle					INR		INR
Fragmin	ochtend				1 injectie	1 injectie	
	avond				1 injectie		

Na de operatie

Uw behandelend specialist geeft na de operatie aan wanneer u de fenprocoumon weer kunt innemen. Voordat u weer goed ingesteld bent op uw eigen bloedverdunner kan het nodig zijn dat u nog een aantal dagen Fragmin (dalteparine) injecties moet gebruiken. Een nieuw recept hiervoor krijgt u van uw specialist.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTInfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTInfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Contact met trombosedienst

U dient de trombosedienst op de hoogte te brengen van uw geplande operatie, het feit dat u dient te stoppen met uw bloedverdunner en als de operatie dag wijzigt. Zij laten u weten wanneer u de INR-waarde moet laten controleren en geven u advies.

Een INR is een laboratoriumtest waarmee de trombosedienst de mate van stolling in uw bloed kan vaststellen.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze folder? Neem dan contact op met ZGT preoperatieve screening en anesthesie, telefoon nummer 088 708 5396.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.