

## Gastroscoopie/Duodenoscopie

Uw behandelend specialist vindt het noodzakelijk dat uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm van binnen wordt onderzocht.

In deze folder vertellen wij u meer over de gang van zaken rondom de gastroscoopie.

### Het onderzoek

In de behandelkamer van het behandelcentrum wordt u verzocht om eventuele gebitsprothese en/of bril te verwijderen.

Zo nodig krijgt u een infuusnaald in de hand /arm waardoor de eventuele sedatie zal worden toegediend. Uw hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte in uw bloed worden door bewakingsapparatuur in de gaten gehouden. Daarna wordt u verzocht om op uw linker zij te gaan liggen.

Vervolgens wordt via de mond het slangetje ingebracht, waardoor de arts de binnenkant van uw maag kan bekijken. In sommige gevallen wordt een klein stukje weefsel op pijnloze wijze uit de maagwand genomen. Soms kan tijdens het onderzoek een behandeling worden gedaan. Dit is meestal voor het begin van het onderzoek bekend en u zult hiervan reeds op de hoogte zijn. Ter voorkoming van onnodige afbreking en herhaling van het onderzoek, gaan we ervan uit dat u hiervoor toestemming geeft. Indien dit niet het geval is, gelieve dit van tevoren kenbaar te maken. De specialist zal deze ingreep na afloop van het onderzoek met u bespreken.

### Duur van het onderzoek

Het gehele onderzoek duurt ongeveer een kwartier.

### Midazolam sedatie/Propofol sedatie

Een sedatie is niet standaard voor een gastroscoopie. Mocht de specialist toch beslissen dat de gastroscoopie onder sedatie mag plaatsvinden, dan is afhankelijk van de

beslissing van de specialist, welke sedatie u krijgt.

Een gastroscoopie kan plaatsvinden onder twee soorten sedatie, namelijk onder Midazolam sedatie (lichte sedatie) of onder Propofol sedatie (matige diepe sedatie). Bij een Propofol sedatie zult u voorafgaand aan de gastroscoopie een afspraak krijgen bij de afdeling preoperatieve screening en anesthesie.

### Vorbereidingen

- Als het onderzoek in de ochtend plaatsvindt dan mag u vanaf 's nachts 00:00 uur niet meer eten. U mag nog tot twee uur voor het onderzoek alleen nog heldere dranken gebruiken.
- Als het onderzoek 's middags na 13.00 uur plaatsvindt mag u nog een licht ontbijt (een naturel beschuit met een kopje thee). U mag dit ontbijt nuttigen tot zes uur voor het onderzoek. U mag nog heldere dranken gebruiken tot twee uur voor het onderzoek.
- Vertel uw behandelend specialist of verpleegkundig specialist of u medicijnen gebruikt, allergisch bent, een longziekte hebt, zwanger bent of ooit aan de maag geopereerd bent;
- U kunt uw medicijnen gewoon blijven innemen, tenzij anders met u is afgesproken.

### Na afloop van het onderzoek

Na afloop van het onderzoek wordt u teruggebracht naar de dagverpleging waar u in de gaten gehouden wordt.

#### Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 [facebook.com/ZGTinfo](https://facebook.com/ZGTinfo)

 [twitter.com/ZGT\\_info](https://twitter.com/ZGT_info)

 [linkedin.com/company/zgt](https://linkedin.com/company/zgt)

 [youtube.com/user/ZGTinfo](https://youtube.com/user/ZGTinfo)

 [zgt.nl](https://zgt.nl) - [zgt.nl/mijnzgt](https://zgt.nl/mijnzgt)

De uitslag van de weefselstukjes duurt enkele dagen. Het kan zijn dat nader onderzoek of behandeling wordt geadviseerd.

Mocht er sedatie gegeven zijn, dan zal de verpleegkundige pols en bloeddruk en saturatie controle uitvoeren, bij terugkomst op de afdeling.

### **Uitslag**

Voordat u naar huis gaat krijgt u een ontslagformulier mee. Hierin staat aangegeven wat er tijdens het onderzoek is gezien of gedaan. Afhankelijk van de verrichtingen die bij het onderzoek zijn gedaan krijgt u van de verpleegkundige te horen van wie u de uitslag gaat krijgen. Mocht u geen sedatie hebben gehad dan zal u direct na het onderzoek geïnformeerd worden door de arts. U krijgt dan geen ontslagformulier mee naar huis.

### **Complicaties**

Tijdens het onderzoek is er een minimale kans dat er in de slokdarm of maag een gaatje (perforatie) ontstaat. Met name is deze kans aanwezig indien een vernauwing moet worden opgerekt. Indien deze complicatie zich voordoet, kan deze vaak zonder operatie worden behandeld. U zult hiervoor dan wel opgenomen blijven.

### **Medicatie**

Indien u medicijnen gebruikt mag u deze tot twee uur voor het onderzoek nog innemen. Soms worden tijdens de gastroscopie kleine ingrepen verricht, zoals het wegnemen van een stukje weefsel voor biopsie. Als u bloed verdunnende middelen gebruikt kan een langdurige bloeding optreden. In overleg met de specialist/arts-assistent zal dit eventueel worden aangepast. Na het onderzoek hoort u van de arts/arts-assistent, wanneer u weer mag starten met de bloed verdunnende medicijnen.

Bent u diabeet en gebruikt u hiervoor medicatie of insuline ook dan krijgt u van de arts/arts-assistent hierover een advies.

### **Begeleiding na sedatie**

Mocht u sedatie hebben gehad dan geldt onderstaande voor u:

- Voor zowel Midazolam sedatie als voor Propofol sedatie geldt; u mag na de behandeling/het onderzoek niet zonder begeleiding naar huis. Zorg dat iemand met u mee komt naar het ziekenhuis. LET OP; Als dit niet geregeld is kan het onderzoek of de behandeling helaas niet doorgaan!
- Bij Midazolam sedatie; U mag tot 24 uur na de sedatie niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer, dus ook geen autorijden, niet zelfstandige gebruik maken van het openbaar vervoer. Neem deze dag geen belangrijke beslissingen. U kunt vergeetachtig zijn.
- Bij Propofol sedatie; zie voor informatie over begeleiding in middag, avond en nacht, deelname aan het verkeer, werken, alcoholgebruik de patiëntenfolder '*sedatie en/of analgesie tijdens onderzoek of behandeling*'. Deze krijgt tijdens de afspraak bij de preoperatieve screenings en anesthesie.
- Indien u na het onderzoek naar huis gaat mag u, in verband met het uitwerken van de sedatie, niet alleen thuis zijn. Zorgt u daarom voor begeleiding voor de middag en avond. Mocht u propofol sedatie hebben gehad dan mag u ook de nacht na het onderzoek niet alleen thuis zijn.

### **Patiëntveiligheid**

ZGT ziet patiëntveiligheid als een vanzelfsprekende basis voor goede zorg en dienstverlening. Verschillende zorgverleners vragen daarom uw naam, geboortedatum en voor welke operatie of ingreep u komt. Dit gebeurt meerdere keren achter elkaar. Deze controle is voor uw veiligheid.

### **Wanneer contact opnemen met het ziekenhuis?**

Complicaties komen bij dit onderzoek heel zelden voor. Hebt u na afloop van het

onderzoek buikpijn, koorts en/of bloedverlies  
Dan belt u met het MDL-centrum. Bereikbaar  
van maandag tot en met vrijdag van 08.30  
uur tot 16.30 uur. Telefoonnummer 088 708  
70 70.

Mochten de complicaties optreden buiten  
kantooruren dan kunt u tot 3 dagen na de  
Gastroscoopie/Duodenoscopie bellen naar de  
klinische MDL-afdeling 5 West;  
telefoonnummer 088 708 34 20.

### **Vragen**

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen  
van deze folder dan kunt u contact opnemen  
met het MDL-centrum,  
telefoonnummer 088 – 708 34 00

### **Check uw dossier op MijnZGT**

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U  
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of  
mobiel delen van uw medisch dossier inzien,  
persoonlijke gegevens checken, of  
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij  
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer  
informatie op: [zgt.nl/mijnzgt](https://zgt.nl/mijnzgt).