

Infusietherapie met Iloprost bij vaatlijden

Uw vaatchirurg heeft samen met u besloten tot een behandeling met een Iloprost infuus. In deze folder leest u meer informatie over deze behandeling. Het is verstandig dat u deze informatiefolder goed doorleest voor u start met de behandeling.

Het effect van Iloprost

Iloprost is een medicijn dat alleen via een infuus toegediend kan worden. Het medicijn heeft bloedvatverwijdende eigenschappen en remt het vastplakken van bloedplaatjes aan de vaatwand. Dit zorgt voor een betere bloeddorstrooming. Op deze manier hopen we dat de doorbloeding van uw handen en/of voeten beter wordt en uw pijnklachten afnemen of verdwijnen. Iloprost wordt onder andere voorgeschreven bij een ernstig fenomeen van Raynaud. Daarnaast wordt het ook gebruikt bij patiënten met niet of slecht genezende wonden aan handen of voeten en bij reumatische auto-immuunziekten zoals systemische sclerose en systemische lupus erythematoses (SLE). Het effect van de behandeling kan direct optreden maar ook meerdere dagen op zich laten wachten. U merkt dan dat de aangedane plekken warmer worden en/of rood verkleuren. Een deel van de behandelde patiënten bemerkt helaas geen positief effect van Iloprost.

De behandeling met Iloprost

Voor een Iloprost infuus wordt u meestal gedurende vijf (soms drie) dagen opgenomen op afdeling 5 Zuid, vaatchirurgie. Wanneer u op de afdeling bent aangekomen wordt een infuus ingebracht en begint de behandeling. Het Iloprost infuus wordt zes uur per dag toegediend. Gedurende deze zes uur dient u aanwezig te blijven op de afdeling. Hierna wordt de medicijnvloeistof van het infuus losgekoppeld. De eerste drie dagen wordt de hoeveelheid Iloprost opgebouwd tot de gewenste dosering bereikt is. Deze dosering is afhankelijk van de bijwerkingen en kan per patiënt verschillen.

Daarom is het belangrijk dat u aangeeft of u bijwerkingen ervaart en of deze draaglijk zijn. Op dag vier en vijf start de verpleegkundige het infuus direct op de gewenste dosering. Tijdens de toediening van Iloprost controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk, pols en wordt u gevraagd hoe u zich voelt. Mocht u vervelende bijwerkingen ervaren, laat dit dan aan de verpleegkundige weten. Bij milde bijwerkingen wordt de iloprost dosering meestal (tijdelijk) verlaagd. Mocht u ernstige bijwerkingen hebben dan wordt het infuus tijdelijk of definitief gestaakt. Wij doen ons best om het u zo aangenaam mogelijk te maken.

Bijwerkingen

De bijwerkingen van Iloprost treden meestal op tijdens de toediening van het medicijn en zijn over het algemeen daarna verdwenen. Hieronder leest u welke bijwerkingen voor kunnen komen bij het gebruik van Iloprost

Meest voorkomende bijwerkingen

- Gevoel van opvliegers met warmtesensatie.
- Blozen, roodheid van de hals en nek.
- Zweten.
- Hoofdpijn.
- Duizeligheid.
- Misselijkheid en braken.

Soms of zelden voorkomende bijwerkingen

- Sterke daling van de bloeddruk.
- Snellere of tragere hartslag dan normaal.
- Pijn op de borst.
- Pijn in handen en voeten waarvoor de behandeling bedoeld is.
- Bloeding.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Wanneer mag u geen Iloprost toegediend krijgen?

- Tijdens de zwangerschap en borstvoeding.
- Bij aandoeningen met een groot risico op bloedingen zoals een maagzweer of een recente bloeding in het hoofd.

Kunt u Iloprost gebruik met andere medicijnen?

Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van bloedverduunners. Gebruikt u bloedverduunners of bloeddrukverlagende/vaatverwijdende medicijnen? Bespreek vóór het infuus met uw vaatchirurg of u deze medicatie tijdelijk moet stoppen of hiermee door mag gaan.

Het is verstandig om tijdens de behandeling met Iloprost geen NSAID's te gebruiken. NSAID's zijn pijnstillers met een ontstekingsremmende werking zoals naproxen, diclofenac en ibuprofen.

Roken

Door roken gaat het effect van Iloprost verloren, omdat de kleine slagaderen weer vernauwen waardoor de doorbloeding slechter wordt. Ook kan het bloed minder zuurstof opnemen. Er komt dus minder bloed naar de weefsels van uw handen en voeten. Het bloed wat er komt bevat minder zuurstof, dit maakt de kans dat uw pijn minder wordt en de eventuele wonden zullen genezen een heel stuk kleiner. Dit geldt zowel tijdens de behandeling met Iloprost als in de maanden erna.

Autorijden

Iloprost kan de bloeddruk verlagen en daardoor klachten als hoofdpijn en duizeligheid geven. Rijd daarom geen auto direct na de behandeling.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze folder vragen; Neem dan contact op met uw vaatchirurg via het secretariaat vaatchirurgie ZGT, telefoonnummer 088 708 52 43. Dit nummer is bereikbaar tijdens kantooruren van 8.30 – 12.30 uur en van 13.00 – 16.30 uur.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.