

Coloscopie bij kinderen

Bij een coloscopie (ook wel colonoscopie genoemd) kijkt de (kinder)arts met behulp van een buigzame buis, een endoscoop, in de dikke darm. Een endoscoop is een buigzame buis met aan het uiteinde een heel kleine camera. Hiermee kan de (kinder)arts de binnenkant van de dikke darm bekijken en zien of er afwijkingen zijn.

Wat gebeurt er bij dit onderzoek

De buigzame endoscoop wordt via de anus ingebracht tot aan de overgang van de dikke naar de dunne darm. Tijdens het onderzoek blazen we lucht in de darm om bepaalde gedeelten van de darm beter zichtbaar te maken. Deze lucht kan na het onderzoek wat hinderlijk zijn en het is normaal dat uw kind na het onderzoek windjes moet laten. Tijdens het onderzoek kan de (kinder)arts weefsel (biopten) wegnemen voor nader onderzoek. Dit is pijnloos. Het verschil tussen de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa kan bij twijfelgevallen pas te zien zijn onder de microscoop. Het volledige onderzoek duurt ongeveer twintig tot dertig minuten. Tijdens het terugtrekken van de endoscoop bekijken we de darm goed. Het onderzoek wordt onder algehele narcose gedaan. Na afloop van het onderzoek is het nodig dat uw kind nog enige tijd blijft om uit te slapen.

Vorbereiding

Voor de opname brengt u samen met uw kind een bezoek aan het service bureau opname en anesthesie. Het is belangrijk dat u uw kind thuis voorbereidt op de opname. Wat u vertelt, is afhankelijk van de leeftijd. Het beste is zo eerlijk en duidelijk mogelijk te zijn over wat er gaat gebeuren. Er zijn verschillende hulpmiddelen waarmee u uw kind al spelend voorbereidt, bijvoorbeeld een dokterskoffertje of boekjes. Ook op de website zgt.nl/kinderen en op kindenziekenhuis.nl vindt u informatie.

Dag voorafgaand aan het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek is het nodig om de dikke darm leeg en schoon te maken. Dit gebeurt door te laxeren. Veel kinderen vinden dit het meest vervelend. Hiervoor nemen wij uw kind één dag voor het onderzoek op. Voor het laxeren moet uw kind binnen een korte tijd een grote hoeveelheid laxeerdrank binnen krijgen. Dit is voor kinderen erg moeilijk. Daarom brengen wij bij uw kind een sonde in. De laxeerdrank dienen wij toe via deze sonde. Tijdens het toedienen kan uw kind gewoon spelen. Door de laxeerdrank moet uw kind vaak naar de wc, tot uiteindelijk de ontlasting uit helder vocht bestaat. De sonde laten we erin zitten voor het onderzoek van de volgende dag. Soms geven we opnieuw laxeerdrank voordat het onderzoek plaatsvindt.

Dag van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek geven we als het nodig is opnieuw laxeerdrank via de sonde. Uw kind moet nuchter zijn voor de coloscopie. Het tijdstip is afhankelijk van de tijd van het onderzoek en de afspraak van de anesthesist. Op de afgesproken tijd brengen wij u met uw kind naar de voorbereidingsruimte van de operatiekamer. Zie voor meer informatie de folder 'Anesthesie kinderen'.

Veiligheid

ZGT ziet veiligheid als basisvereiste voor goede zorg en dienstverlening. Alle patiënten kunnen erop vertrouwen dat zij veilige en goede zorg ontvangen. Van een aantal zaken merkt u niets, van andere wel. Zo wordt

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTInfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTInfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

gewerkt met een 'time-out' procedure. Dit betekent dat door verschillende mensen een aantal zaken extra gecontroleerd worden. Zij controleren meerdere keren de naam, geboortedatum van uw kind en voor welk onderzoek uw kind komt.

Nazorg

Als het onderzoek achter de rug is, slaapt uw kind eerst uit op de uitslaapkamer (recovery) en daarna op de kinderafdeling. Daar houdt de kinderverpleegkundige uw kind nog even in de gaten. Wij letten op pijn, misselijkheid en bloedverlies uit de anus. Thuis dient u ook te letten op bloedverlies uit de anus.

De (kinder)arts vertelt u zo snel mogelijk de eerste bevindingen van het onderzoek. Het onderzoeken van eventueel weggenomen weefsel duurt langer. Die uitslag hoort u later, hiervoor maken we een belafsprake met u.

Mogelijke complicaties

- Bloedverlies uit de anus;
- Koorts boven 38,5°C;
- Pijn, ondanks gegeven pijnstillers.

Vragen

Deze folder bevat algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend specialist. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit wordt altijd door uw behandelend specialist aan u kenbaar gemaakt.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan op werkdagen contact op met de verpleegafdeling kindergeneeskunde of de polikliniek kindergeneeskunde.

Verpleegafdeling kindergeneeskunde Ziekenhuislocatie Almelo

Telefoonnummer 088 708 44 50

Polikliniek kindergeneeskunde

Binnen kantooruren

Telefoonnummer 088 708 31 20

Buiten kantooruren

Indien uw vraag niet kan wachten tot de volgende werkdag.

Telefoonnummer 088 708 78 78

Bronnen: Bron: Darmwereld vzw, crohnsite.be. Onder de rubriek diagnose vindt u coloscopie.

Check het dossier van uw kind op MijnzGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van het medisch dossier van uw kind inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij hebben klaargezet. Zie voor meer informatie de folder '[MijnZGT machtiging voor ouders](#)'.