

Dacryocystografie

U bent door uw arts naar de afdeling radiologie verwezen voor een onderzoek van de traanwegen eventueel gevolgd door een behandeling. Na overleg met uw arts heeft u hiermee ingestemd. Het onderzoek/behandeling wordt verricht door een radioloog, geassisteerd door radiodiagnostisch laboranten.

Het doel van het onderzoek is het zichtbaar maken van de traanwegen met behulp van contrastmiddel en röntgenstralen. Hiermee kan worden nagegaan of uw klachten van tranenvloed worden veroorzaakt door verstopte traanwegen en of deze verstopping geschikt is om te behandelen met een dotterprocedure.

Vorbereiding

Het beste kunt u gemakkelijke kleding aantrekken en sieraden zoveel mogelijk thuis laten. Aangezien het een onderzoek van het oog betreft wordt het gebruik van oog make-up is af te raden.

Verloop van het onderzoek

U wordt verzocht plaats te nemen op de onderzoekstafel. Het aangedane oog wordt verdoofd door middel van oogdruppels. De radioloog (de arts die het onderzoek zal uitvoeren) zal een van de twee ingangen van de traanwegen gebruiken om een katheter (dun slangetje) een klein stukje in op te schuiven. Hierna wordt contrastmiddel door het slangetje in de traanwegen gespoten. Op deze manier worden de traanwegen afgebeeld. Het is heel belangrijk, dat u tijdens het maken van de opnames stil blijft liggen. Na het maken van de opnames worden deze beoordeeld door de radioloog, die aan de hand hiervan zal beslissen of het mogelijk is om u te dotteren (behandelen).

Waarschuwingen

Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of denkt te zijn, moet u dit voor het onderzoek melden.

Patiënten die hierover in onzekerheid verkeren, dienen contact op te nemen met de behandelend arts en de afdeling radiologie. Als u overgevoelig bent voor jodium, contrastvloeistof of last hebt van allergische reacties, wilt u dit dan voor het onderzoek melden.

Na het onderzoek

Door de oogdruppels die ter verdoving tijdens het onderzoek worden gebruikt kunt u

tijdelijk wazig zien. (2 uur) Gedurende de tijd dat u wazig ziet mag u niet deelnemen aan het verkeer.

Indien u wordt gedotterd of een stent wordt geplaatst krijgt u een recept mee voor oogdruppels en indien nodig antibiotica, deze kunt u bij uw apotheek ophalen.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 15 - 30 minuten.

Uitslag.

Deze ontvangt u conform de met u gemaakte afspraak van uw behandelende specialist.

Afzeggen van het onderzoek.

Mocht u de afspraak niet kunnen nakomen, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden aan de afdeling radiologie 088 708 37 00.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen ze graag voor u beantwoorden.

Op werkdagen is de afdeling radiologie tussen 08.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 088 708 37 00.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet.

Kijk voor meer info op: www.zgt.nl/mijnzgt.

Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt